



Protocole de Vaccination pour les Patients atteints d'une Amylose Cardiaque Par le Réseau Amylose Mondor

Nom de virus ou de bactérie	Amylose AL	Amylose ATTR héréditaire ou sauvage
COVID19	<ul style="list-style-type: none">- ARN 3 doses- A faire sous chimiothérapie (la vaccination ne doit pas retarder la chimiothérapie)- En respect des contre-indications.- A adapter à l'évolution de la pandémie.	<ul style="list-style-type: none">- ARN 3 doses en fonction de l'âge- Pas d'interaction avec les traitements de l'amylose (Tafamidis, Patisiran...).- En respect des contre-indications.- A adapter à l'évolution de la pandémie.
Pneumocoque	<ul style="list-style-type: none">- Une dose de vaccin conjugué 13-valent (Ex : Prévenar),- Suivie d'une dose de vaccin non conjugué 23-valent (Ex : Pneumovax) deux mois après.- Pas de rappel en fin de chimio- A 5 ans un rappel avec vaccin non conjugué 23-valent (Ex : Pneumovax)- En respect des contre-indications.	<ul style="list-style-type: none">- Une dose de vaccin conjugué 13-valent (Ex : Prévenar),- Suivie d'une dose de vaccin non conjugué 23-valent (Ex : Pneumovax) deux mois après.- A 5 ans un rappel avec vaccin non conjugué 23-valent (Ex : Pneumovax)- En respect des contre-indications.
Grippe	<ul style="list-style-type: none">- Faire le vaccin grippal à l'automne ou en période épidémique » même sous chimiothérapie- En respect des contre-indications.	<ul style="list-style-type: none">- Faire le vaccin grippal à l'automne ou en période épidémique ».- En respect des contre-indications.
Haemophilus Influenzae B (HIB)	<ul style="list-style-type: none">- Le vaccin HIB protège uniquement contre la souche capsulée B et pas celles, nombreuses, non capsulée responsables de pneumopathie. Pas de vaccination recommandée- En respect des contre-indications.	
Diphtérie et Tetanos Poliomyélite (DTP)	<ul style="list-style-type: none">- Si vaccination non à jour : Faire un rappel DTP en fin de chimio, c'est à dire si le patient ne l'a pas reçu depuis >10 ans.- En respect des contre-indications.	<ul style="list-style-type: none">- Si vaccination non à jour (> de 10 ans) : Faire un rappel DTP- En respect des contre-indications.
HBV	<ul style="list-style-type: none">- Seulement si patient a risque HBV selon les recommandations nationales : voyage en zone a risque HBV, rapports sexuels a risque, transplanté hépatique- En respect des contre-indications.	
ET SI PLUSIEURS VACCINS A FAIRE	<ul style="list-style-type: none">- COVID19, Grippe, Pneumo et HBV peuvent être faits en même temps comme la grande majorité des vaccins (c'est à dire le même jour à des endroits différents, bras, cuisse, ventre).- En respect des contre-indications.	
VACCINER LES PROCHES	<ul style="list-style-type: none">- Important : le "cocooning", vacciner les proches contre la COVID19 et la Grippe+++ comme pour tous les immunodéprimés	