



Attention J'ai une hypotension TRES SEVERE



1/ Port de bas de contention 24 sur 24H

- Adaptée à la taille et au changement musculaire
- De force 2 uniquement
- A Garder même la nuit
- Pas de bande, ni de chaussette
- Bas remontés jusqu'en haut des cuisses.



4/ Bien s'hydrater

- Verres d'eau +/-aromatisée
- Hydratation parentérale si nécessaire



2/ Médicaments spécifiques :

- Tous les 3 à 4 heures ex : 7h 10h-13h-16h
- Respecter les horaires++++
- Attendre 1h après la prise pour bouger afin le traitement soit assimilé et efficace.



5/ Attention aux troubles digestifs associés :

- Aggravation de l'hypotension et de la déshydratation
- Attention au diarrhées : traitement systématique
- Traitement systématique des vomissements

3/ REPOS STRICT AU LIT incliné de 10 à 15°C jambe en bas = NE PAS LEVER

- Journée: Tête levée à 30°C+ lit incliné de 10°C si pas de PC.
- La nuit : lit incliné en jambes vers le bas (10°)
- Matelas anti- escarres
- Pas de lever même pour aller aux toilettes



ASSISTANCE
PUBLIQUE  HÔPITAUX
DE PARIS



Pour plus d'informations sur l'amylose : www.reseau-amylose.org